


**ЭКСДЖИВА®**  
(деносумаб)

**Когда необходимо  
сохранить то, что важно.  
Важна профилактика!**



# Эксджива® является первым и единственным ингибитором RANK-лиганда. Помогает предотвратить КО<sup>1,2</sup>

**1**  
ЭКСДЖИВА® связывается непосредственно с RANK-лигандом, предотвращая активацию RANK-рецептора на остеокластах

**2**  
Связываясь с RANK-лигандом, ЭКСДЖИВА® ингибирует созревание, функционирование и выживание остеокластов

**3**  
ЭКСДЖИВА® препятствует созреванию остеокластов, снижая костную резорбцию и прерывая «порочный круг» костной деструкции



# Показания к применению препарата Эксджива® (деносумаб 120 мг) в Российской Федерации \*



## Множественная миелома и злокачественные опухоли с метастазами в кости

Препарат Эксджива показан для профилактики костных осложнений у пациентов с множественной миеломой и у пациентов с солидными опухолями с метастазами в кости

### Рекомендуемая доза:

одна подкожная инъекция 120 мг каждые 4 недели в бедро, живот или плечо.



## Гигантоклеточная опухоль кости

Лечение нерезектабельной гигантоклеточной опухоли кости у взрослых пациентов или подростков со сформировавшимся скелетом, а также в случаях, когда хирургическое вмешательство сопряжено с высоким риском серьезных осложнений

### Рекомендуемая доза:

120 мг подкожно 1 раз в 4 недели в бедро, живот или плечо, с дополнительными дозами 120 мг на 8 и 15 дни первого месяца



## Гиперкальциемия при злокачественных опухолях

Лечение гиперкальциемии при злокачественных опухолях у взрослых пациентов, резистентных к лечению внутривенными бисфосфонатами

### Рекомендуемая доза:

120 мг каждые 4 недели с дополнительными дозами 120 мг на 8 и 15 дни первого месяца лечения.

\*Всем пациентам, кроме пациентов с гиперкальциемией, необходимо дополнительно принимать препараты кальция в дозе минимум 500 мг/сутки и витамина D в дозе 400 МЕ/сутки

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Эксджива®, ЛП-000871

**ЭКСДЖИВА®**  
(деносумаб)

# ЕСЛИ НЕОБХОДИМ ВЫБОР РОССИЙСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

**Деносумаб в первую очередь следует назначать пациентам\* в следующих клинических ситуациях:**

1. Нарушение функции почек по клиренсу креатинина
2. Наличие болевого синдрома
3. Множественные метастазы в кости (> 2)
4. Преимущественное поражение осевого скелета (позвоночник, кости таза)
5. Существующая угроза патологического перелома
6. Отсутствие адекватного венозного доступа

**Критерии  
высокого риска  
развития КО**



**ЭКСДЖИВА®**  
(деносумаб)

**Применение препарата Эксджива®  
дает пациентам больше времени  
без костных осложнений\* и боли<sup>1-3</sup>**

\*К костным осложнениям (КО), также известным как события, связанные со скелетом, относятся: патологические переломы, лучевая терапия, компрессия спинного мозга, или хирургические вмешательства на кости). Применение данного лекарственного препарата подлежит дополнительному мониторингу. Это позволит быстро идентифицировать новую информацию о безопасности. Пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по применению и информацией по репортированию нежелательных явлений.

1. Coleman R, et al. Ann Oncol. 2014;25(Suppl. 3): 124-137. 2. Lipton A. et al. Eur J Cancer. 2012;48:3082-3092; 3. von Moos R, et al. Support Care Cancer. 2016;24:1327-1337.